

失而复现的10种珍稀野生动物

随着地球环境遭受到越来越严重的破坏，不少生物学家认为地球已经进入了第六次生物大灭绝时期。据统计，目前全世界每天有 75 个物种灭绝，每小时大约有 3 个物种灭绝。然而，生物学家发现，这种灭绝现象也有例外，有些在几十年前已经宣告灭绝的物种在野外又被人们重新发现了。生命的顽强有时候超出我们的想象，这些失而复现的动物就是很好的例证。

大嘴苇莺

消失时间:1867 年 复现时间:2006 年

1867 年，人们在印度苏特莱杰河流域发现大嘴苇莺，之后它便消失在人们的视野之外。由于这种鸟十分罕见，科学家不清楚它是新的物种还是常见种类的畸形鸟。2006 年，泰国研究人员在距离泰国曼谷大约 3000 公里的一处湿地里发现了大嘴苇莺，并捕捉到一只制作成标本。至此，研究人员才确认大嘴苇莺是一个新的物种。研究人员表示，大嘴苇莺可能在中国西南地区 and 东南亚多个国家都有栖息地，只是每个地区数量较少而很少被人们发现，而且容易和其他湿地鸟混淆。

邦盖乌鸦

消失时间:1900 年 复现时间:2007 年

1900 年，美国研究人员在印度尼西亚发现了 2 只邦盖乌鸦，并将它制成标本陈列在美国自然历史博物馆里。然而，此后再也没有人发现这种乌鸦，研究人员宣称这种乌鸦已经灭绝。与其他乌鸦相区别的是，邦盖乌鸦有纯黑色的虹膜和稍短的尾巴。2007 年，美国密歇根大学的研究人员在印度尼西亚重新发现了邦盖乌鸦，它们出现在偏远的邦盖岛的山林里。然而，这个偏远的岛屿上也出现毁林开荒的农民和一些盗伐者。当地政府为了保护包括邦盖乌鸦在内的珍稀动物，开始加强对当地森林的保护。

贝氏海燕

消失时间:1920 年 复现时间:2009 年

在巴布亚新几内亚的一些岛屿上，曾经生活着大量贝氏海燕。20 世纪初，探险者和游客大量进入到这些岛屿，并带来了这里原本没有的老鼠和猫，它们大量捕获贝氏海燕巢穴中的巴布亚新几内亚鸟蛋和幼鸟。1920 年左右，贝氏海燕消失了。2009 年，以色列鸟类学家哈多拉姆·什利哈在俾斯麦群岛上发现了贝氏海燕，并拍摄到了 30 多张照片。贝氏海燕身体呈深褐色，腹部灰白，鼻子呈管状。

侏儒眼镜猴

消失时间:1921 年 复现时间:2000 年

1921 年，印度尼西亚研究人员捕捉到几只侏儒眼镜猴制成了标本。此后的几十年内，人们再也没有这种可爱得如同毛绒玩具般的动物，它们因此进入了灭绝动物名单。2000 年，研究人员正在苏拉威西岛中心的瑞林都国家公园内诱捕老鼠，却意外地诱捕到一只侏儒眼镜猴。此后，研究人员又陆续发现了一些侏儒眼镜猴。2008 年，研究人员还捕捉到 2 只雄性和 1 只雌性侏儒眼镜猴，并给它们佩戴无线电子发射跟踪脚环，对它们的生活进行研究。瑞林都国家公园占地 2000 平方公里，其中有 60 个村落在侏儒眼镜猴的生存领地正在遭受村民们的破坏。侏儒眼镜猴是世界上最小和珍奇的灵长目动物之一，全身茸毛，头部能够转动 180 度。

彩虹蟾蜍

消失时间:1924 年 复现时间:2011 年

1924 年，研究人员在婆罗洲岛发现了 3 只彩虹蟾蜍。它们是世界上色彩最绚丽的蟾蜍，也是一种世界上最罕见的蟾蜍。之后，再也没有人发现过它们的踪迹。在过去将近 90 年的时间里，人们对它们的认识仅限于插图介绍。研究人员一度以

为这种漂亮的蟾蜍灭绝了。2011 年，“保护国际”组织的研究人员在东南亚的婆罗洲岛重新发现了 3 只彩虹蟾蜍。它们分别是一只雄性、一只雌性和一只幼仔，很像是一家三口。那只雄性的彩虹蟾蜍体长最长，为 5.1 厘米。

象牙喙啄木鸟

消失时间:1944 年 复现时间:2005 年

1944 年，研究人员在美国的一片树林里观察象牙喙啄木鸟。此后 60 年的时间里，象牙喙啄木鸟消失了，被列入灭绝物种名单。2005 年 4 月，一位观鸟者划着小船在美国阿肯色州一片沼泽地里发现了一只象牙喙啄木鸟。此后，30 名鸟类学家进入这片沼泽地观察，发现了许多只象牙喙啄木鸟，并拍摄下录像。目前，这片地区成为了象牙喙啄木鸟保护区。象牙喙啄木鸟因为长着一只象牙般的大嘴而得名，是全世界体形最大的啄木鸟之一，体长为 50 厘米，翼展为 90 厘米。

阿拉干森林龟

消失时间:1960 年 复现时间:2009 年

1908 年，缅甸和美国研究人员在缅甸的一些森林里发现了奇特的阿拉干森林龟。当地人称之为“犀牛粪便”，因为这种龟主要以犀牛的粪便为食。然而，1960 年左右，缅甸境内的野生犀牛全部灭绝，以犀牛粪便为食的阿拉干森林龟也很快消失在人们的视野之外，随后出现在灭绝动物的名单上。2009 年，研究人员在缅甸一个大象保护区内发现了 2 只野生的阿拉干森林龟。目前，这种乌龟已经改变了饮食习惯，主要以大象等食草性哺乳动物的粪便为食。

朱鹮

消失时间:1978 年 复现时间:1981 年

1964 年，我国研究人员在甘肃捕获一只朱鹮以来，一直没有发现朱鹮的踪迹。1978 年，日本一只野生朱鹮在一个小岛上死亡，日本研究人员宣称这是世界上最后一只野生朱鹮。1981 年，中国研究人员在陕西省汉中市洋县发现 7 只野生朱鹮，从而宣告在中国重新发现朱鹮野生种群，这也是世界上仅存的一个朱鹮野生种群。此后，我国对朱鹮的保护和科学研究取得显著成果。目前，中国境内的野生朱鹮已近 2000 余只。

斑鳖

消失时间:1980 年 复现时间:2008 年

在中国和越南的江河湖泊中，曾经生活着大量斑鳖。斑鳖是一只巨大的软壳淡水龟，成年后体长超过 1 米，体重可达数百公斤，寿命可达 100 岁以上。然而，由于河流受到污染，斑鳖在 1980 年左右就从天然水域中消失了。2008 年，美国研究人员在越南一条天然河流中发现了野生的斑鳖，当时它被洪水冲到堤坝上。当地人捕获了这只野生斑鳖，准备把它送到餐馆卖掉，幸亏研究人员及时阻止了他们的行为，并将这只斑鳖放入到河流中。目前，饲养在人工湖泊或水塘中的斑鳖也只有 3 只，一只在越南的还剑湖里，另外 2 只在中国长沙和苏州的动物园里。

装甲雾蛙

消失时间:1991 年 复现时间:2008 年

装甲雾蛙曾经广泛生活在澳大利亚西北部雨林中的溪流里。然而，随着全球变暖的加剧，对两栖动物有严重危害的壶菌在澳大利亚雨林的溪流中繁殖速度加快，壶菌病开始在这片地区的蛙群中爆发，各种蛙类迅速减少，最为脆弱的装甲雾蛙从 1991 年开始一度消失，人们以为它们灭绝了。2008 年，有人发现了几只已经冻结的装甲雾蛙。虽然没有发现活的装甲雾蛙，但是研究人员认为野生的装甲雾蛙仍然存在。装甲雾蛙身体呈浅褐色，因它们身上布满如同铠甲的深褐色斑点而得名。



■ 大嘴苇莺



■ 贝氏海燕



■ 彩虹蟾蜍



■ 阿拉干森林龟



■ 斑鳖



■ 邦盖乌鸦



■ 侏儒眼镜猴



■ 象牙喙啄木鸟



■ 朱鹮



■ 装甲雾蛙