



首届上海荷花展花情预报


虽说申城一直酷暑难耐，但这样的高温天对于荷花、睡莲、王莲来说却是“最好的天气”，本周，首届上海荷花展荷花、睡莲、王莲集体迎来花开最美的时节，朵朵荷花在阳光下映照和绿叶衬托下显得更为清丽，而花叶美丽，赏心悦目的睡莲，飘逸出一丝淡淡的恬静，顿觉如清风入怀，很是惬意。本周看点较丰富，具体如下：

荷花 本周起，南大门前“亭林荷韵”景点内的千瓣莲进入盛花期，花形硕大、形态富丽，既典雅别致又富有韵味。不系丹戎鹅池前塘栽多个复色杂交荷花品种进入最佳观赏期，如戏鹅池内伯里夫人、卡罗林皇后、大洒锦等品种、小草坪东南侧石桥下的红牡丹、卓越等，君子堂北侧湖内的白雪公主、小醉仙等都陆续进入开花期，朵朵荷花如亭亭玉立的少女，在水中央的“舞台”上翩翩起舞，给游客们带来了不一样的赏荷体验。此外小草坪的精品缸栽荷花品种笑靥、春回、三色莲、展宏图、红日东升等精品荷花将开放，拥有荷花界罕有“蓝色基因”的品种“瑶池幻影”也将在本周开放，市民游客可来园一饱眼福。

睡莲 本周起，塘栽精品睡莲将唱主角，主办方从全球睡莲最佳培育地泰国、美国等地引进珍稀热带、寒带睡莲品种，这些品种大多首次在中国展出，其中不少品种在全球数量非常有限，分别种植在盆景园、鸳鸯湖、不可无竹居、小草坪四大睡莲池，每天清晨至中午、晚间至次日中午呈现蓝色、蓝紫、紫色、葡萄酒红、杏黄、金黄、橙黄、粉白、淡粉、粉红、深红、红色等近30种不同颜色，游客可近距离观赏美而不妖，独特委婉的品种睡莲。（姚永新 孙佳）



寒带睡莲“满满” 本版图片 毛晓华 记者 周馨 摄



寒带睡莲“征服者”



“荷花夫妻”漫谈 荷花知识

荷花常见的虫害有哪些？如何防治？

荷花最主要的常见虫害，一是莲缢管蚜，4月中旬荷卷刚出水便有缢管蚜爬附上面吸取汁液。4-10月均可发现缢管蚜，以若虫、成虫群集于荷卷、嫩叶、嫩柄、花蕾上为害。少量发生时可用手掐死；大量发生时，可用化学药剂，如抗蚜威2000-3000倍液或灭杀毙6000倍液、溴氰菊酯2000-3000倍液、乐果1000-1500倍液喷杀。二是斜纹夜蛾，以幼虫食叶为害。长江流域一年可繁殖4-5代，7-8月为严重为害期。可用敌百虫或灭杀毙6000-8000倍液、三氟氰菊酯5000倍液喷杀。

荷花有哪些敌害？如何防治？

最主要的敌害，一是克氏原螯虾（简称螯虾）。多夜间出来摄食莲苗、嫩茎、嫩叶柄、嫩花柄，严重时可使全池荷花覆灭。防治方法：勤除荷塘水草，破坏栖息地，设笼诱杀或垂钩捕捉；撒布敌杀死（每700m²，用量40-50mg），二是椎实螺和福寿螺，前者体形较小，后者大。主要危害荷苗、幼叶，睡莲、王莲均受其害。防治方法：主要用茶饼粉撒入莲池药杀，每667m²，用量为10kg。

盆、池中常滋生苔藓、浮萍对荷花有无影响？怎么处理？

凡有荷花生长的沼泽地，必然滋生蒲草、芦苇、浮萍、藻类、苔藓等其他水生植物，这是自然水生生态物种多样性现象。所以即或由人工栽培的荷池，乃至缸盆栽者，往往有这类水草与之伴生，不足为怪。但由于它们的繁衍，势必与荷花争夺养分。同时，水面被封盖，阳光不能透射，妨碍水温的提升，对荷花初期生长不利，且有碍观瞻。用药物防治这些杂草，剂量难掌握，效果欠佳，故应尽量人工捞除。

5000年前就被奉为圣花

在古埃及，早在公元前3000多年就把蓝睡莲奉为圣花，希腊人赏识睡莲的最早可靠记录是在公元1世纪出版的植物志，其中有一段是叙述希腊人常以睡莲图案作为雕饰的题材。在英国，人们把睡莲的茎块用作天然染料的来源，在法国则利用睡莲作为酿制啤酒的重要原料。总之，在欧洲，古希腊人或古埃及人都把睡莲花视为美丽、纯洁及高尚品德的化身和象征。

睡莲不但观赏价值高，还具有水体净化价值，早在2000年前，中国汉代的私家园林中就出现过它的身影。在16世纪，意大利就把它作为水景主题材料。因为睡莲根能吸收水中的汞、铅、苯酚等有毒物质，还能过滤水中的微生物，经实验证明，是难得的水体净化植物材料，近年来，在城市水体净化、绿化美化建设中受到越来越多的关注。

五大色系再现《睡莲》意境

首届上海荷花展以名画意境打造的睡莲展区——“莫奈睡莲”池塘内，种植了白色、黄色、橙色、粉色、红色系五大色系近30个睡莲品种。其中花瓣墨红色、花朵中心花瓣几近黑色的“奥毛斯特”，草莓红色花瓣、花萼白色的“玛珊姑娘”，花色雪白纯洁的“双倍白”，以及花色鲜黄，原产于北美的“墨西哥黄睡莲”等都具有很高的观赏价值。

睡莲名品会变色 会变装

首届上海荷花展上展出了一批耐寒性睡莲名品，它们白天开花、下午闭合，有时“睡着”有时又“醒着”，不仅会变色，还会变装，特别叫人喜爱，下面几种睡莲品种最不容错过——

“千变女王”万维莎

是耐寒睡莲中唯一的酒金型品种，拥有橙红色的花朵，花瓣上镶嵌杏黄色辐条纹，如佛光一样呈现放射状，有时还会发生变异，同时出现橘红、橙黄、杏黄三种颜色，“万维莎”曾经在2010年一举夺得耐寒性睡莲新品种冠军、睡莲新品种总冠军。观赏地：盆景园、鸳鸯湖

“变脸王”渴望者

是耐寒性睡莲的中大型品种，它的花朵颜色“三日三变”，花朵的形态也会从杯状转成放射状。第一天开花为杏黄色，第二天开花呈金黄色带粉色，第三天开花又呈现深橙黄色，内层花瓣泛红色，花瓣尖端又带有黄色元素。观赏地：盆景园精品睡莲池

“叶色华丽”的亚克

是耐寒性睡莲的中大型品种，花瓣狭长锐尖，呈披针状，花态呈星芒放射状。开花第一天花色淡粉，第二天逐渐变成白色。最特别的是，它的叶片（俗称花叶）色彩斑驳，具有粉红色、奶黄色、紫色、玫瑰色、白色和古铜色多色斑块相间，极具有观赏价值。观赏地：盆景园精品睡莲池

“形如瓷碗”的克里三萨

是耐寒性睡莲的中型品种。又短又圆的花瓣组合成一只只橙红色的小碗，随着开花进程，花色逐渐加深，外轮花瓣通常为乳黄色，内轮花瓣的颜色稍深，一或更多萼片上通常具少量短小的红色条纹，第三天为淡红色斑点。观赏地：盆景园精品睡莲池

“形如红酒杯”的红雷克

是耐寒性睡莲的小型品种，开花极多。花色深葡萄酒红，非常艳丽，随着开花时间，花色日渐变深。新叶有紫色斑纹，成熟后转为绿色。观赏地：盆景园精品睡莲池

“卷发美女”红蜘蛛

为耐寒性睡莲的中大型品种，Marliac型块茎，开花较多，花色从内到外逐渐变深，花朵呈现放射星芒状。有意思的是它的花瓣又卷又皱，像是烫过离子烫一般，模样十分可爱。

“形似荷花”的荷瓣睡莲

为耐寒性睡莲的中大型品种，Marliac型块茎，花色紫红，花蕾圆桃形，花瓣宽厚形似荷花，具有芳香。开花时，瓣阔椭圆至倒卵形，花瓣上部层层向内扣叠，使花朵呈深碗状，极为特别。同时外层花瓣深紫红色，内面色略淡，内层花瓣色渐淡，最内层花瓣呈橘红色，花色也有一定的层次感。

“形似牡丹”的莹宝石

为耐寒性睡莲的中型品种，花色深粉红色，花瓣上具有稍暗的粉红色纵向脉纹，花瓣较宽，先端钝圆，雄蕊橙红色，雌蕊金黄色，花形如一朵绽放的牡丹，1990年曾获得“国际睡莲协会美国奖”，是第一个获此殊荣的香睡莲型根茎品种。

相关链接

【睡莲的观赏时间】

白天开花的睡莲品种包括耐寒性睡莲和绝大部分的热带睡莲品种。由于对阳光反应特别敏感，所以睡莲比较害怕高温和太阳直射。白天开花的睡莲常在早晨9点至下午3点开放，单朵花的开放过程，一株持续3-4天左右。最佳赏花时间通常为上午6:00至10:00，如遇上阴天或细雨，观赏效果则更添一份雅致意境。

【睡莲的养护方法】

1. 栽种方法。主要有盆栽和池栽两种，盆栽一般在每年春分前后，在花盆底部放入腐熟的豆饼或骨粉、蹄片等肥料，上面放入30厘米以上肥沃河泥，然后将带有芽眼的根平栽入河泥中，覆土没过顶芽，放入一厘米的粗砂与小卵石，然后在盆中或缸中加水。高温季节及时换水，以免藻类的产生而影响其美观。池栽则是于早春将水放净，施入基肥后添入新塘泥，灌入充足的水栽植。冬季灌水深度保持1.1米以上，可使根茎安全越冬。

2. 养护方法。一是要选好栽培土，选用长期淤积在河内或塘内的淤泥为好。二是选择好种茎，选取生长旺盛健壮、无病毒、无损伤、无腐烂，带有新芽的一段，一般切成6-10厘米长的段块。三是适当浅栽，一般保持地下茎上的新芽与土面相平为宜。四是光照充足，阳光充足、温暖潮湿、通风良好的气候为宜。

3. 夏季养护的注意事项。睡莲属强光植物，喜通风良好、温暖而平静的水面。特别要求清洁的水质，否则，叶片腐烂。随着气温上升，叶子伸展和逐渐加大，夏季灌水深度约15厘米，若换水，应在清晨进行，高温季节要注意保持盆水的清洁，开花后及时把枯死的叶片、叶柄和花梗剪掉，防止消耗养分并能保持植株美观。但花谢后沉入水中的花梗切不可剪掉，以使它们完成结实阶段。（姚永新 孙佳）



睡莲“渴望者”

法国印象派大师莫奈画布上的《睡莲》，有各种形状各种色彩：有浓荫背景下花叶的姿态，有蓝色雾中朦胧的花影，有色彩绚丽的线条细描，也有只见色块不见轮廓的狂放写意……由新民晚报、古猗园联合主办的首届上海荷花展上，主办方通过“精设计+巧布局”的方式，在镜子般的浅水池里，种植不同品种的耐寒性睡莲，将一些鲜活艳丽的颜色，结合名画的形式布置出来，打造出由近及远延伸的视觉效果，再现名画《睡莲》意境，让游客在远处，可欣赏到睡莲的姿态各异和丰富的花瓣颜色，在远处，可欣赏到成片簇拥，犹如一座座浮动的立体花坛的睡莲。

莫奈名画《睡莲》有了实景版

首届上海荷花展以名画意境布置睡莲展区